Palette végétale

Maine-et-Loire



Planter local

Pourquoi ?

- Favoriser les **interactions** entre la flore indigène et les pollinisateurs
- **Limiter** l'introduction d'espèces exotiques envahissantes
- Contribuer aux **continuités écologiques** pour maintenir les trames vertes et bleues (TVB)
- Favoriser la **résilience** des écosystèmes
- Atténuer les effets du **changement climatique** (îlots de chaleur)
- **Diversifier** les cortèges floristiques en milieu urbain

Comment ?

La marque **Végétal local** (*https://www.vegetal-local.fr/*) assure une provenance locale de végétaux indigènes, une prise en compte de la diversité génétique des plantes ainsi qu'une conservation des ressources qui sont récupérées en milieu naturel. Cette palette se base sur la liste d'espèces dont la répartition biogéographique correspond à celle du **Grand Ouest** dont le Maine-et-Loire fait partie, tout en appréhendant le processus de dérive climatique.



Sommaire

Un mot sur... les espèces exotiques envahissantes.....p.1
Milieu boisé - Strates arboré et arbustive.....p.2
Milieu boisé - Strate herbacée.....p.3
Milieu ouvert - Haie champêtre.....p.4
Milieu ouvert - Les prairies.....p.5
Milieu ouvert - Les gazons.....p.6
Milieu ouvert - Les parterres.....p.7
Milieu rocailleux.....p.8
Milieu humide - Strates arboré et arbustive.....p.9
Milieu humide - Strate herbacée.....p.10
Bibliographie.....p.11

Conseils généraux

- **Valoriser** et **préserver** la flore spontanée que l'on peut déjà observer avant de semer. Cette dernière n'inclut aucun coût financier ! Par exemple, il peut être intéressant de laisser la flore s'installer sur les terrepleins, les fossés ou encore les bords de chemins.
- Réaliser avant tout ensemencement ou plantation une **étude sur la composition des sols et les conditions du milieu** (humidité, luminosité...) afin d'installer les espèces végétales les mieux adaptées au substrat.
- **Essayer de relier** les espaces végétalisés dans les milieux urbanisés afin de contribuer à une biodiversité plus importante sur le territoire.
- **Eviter** les plantes toxiques, allergisantes ou présentant des caractéristiques anatomiques comme des aiguillons ou des épines dans les endroits fréquentés par des enfants.
- **Sensibiliser** les agents techniques à la biodiversité, en expliquant comment et pourquoi il est essentiel de sauvegarder ce patrimoine naturel. En application, un calendrier de taille ou de fauche peut être mis en place.

Un mot sur...

Les espèces exotiques envahissantes

Nom scientifique	Nom vernaculaire
Acacia dealbata	Mimosa d'hiver
Acer negundo	Erable negundo
Ailanthus altissima	Ailanthe glanduleux
Ambrosia artemisiifolia	Ambroisie à feuilles d'armoises
Azolla filiculoides	Azolle fausse-filicule
Baccharis halimifolia	Séneçon en arbre
Bidens frondosa	Bident feuillé
Buddleja davidii	Arbre à papillon
Cortaderia selloana	Herbe de la pampa
Cotoneaster coriaceus	Cotonéaster coriace
Cyperus eragrostis	Souchet vigoureux
Digitaria aequiglumis	Digitaire à glumes égales
Elodea canadensis	Elodée du Canada
Epilobium ciliatum	Epilobe ciliée
Erigeron canadensis	Vergerette du Canada
Erigeron floribundus	Vergerette très fleurie
Erigeron karvinskianus	Vergerette de Karwinski
Erigeron sumatrensis	Vergerette de Sumatra
Galega officinalis	Galéga officinal
Impatiens glandulifera	Balsamine de l'Himalaya
Lagarosiphon major	Grand lagarosiphon
Lemna minuta	Lentille d'eau minuscule
Lindernia dubia	Fausse Gratiole
Lonicera japonica	Chèvrefeuille du Japon
Ludwigia peploides	Jussie à grandes fleurs
Myriophyllum aquaticum	Myriophylle aquatique
Parthenocissus inserta	Vigne-vierge commune
Paspalum dilatatum	Paspale dilaté
Paspalum distichum	Paspale à deux épis
Phytolacca americana	Raisin d'Amérique
Populus x canadensis	Peuplier du Canada
Potentilla indica	Fraisier de Duchesne
Prunus laurocerasus	Laurier-cerise
Prunus serotina	Cerisier tardif
Pyracantha coccinea	Buisson ardent
Quercus rubra	Chêne rouge d'Amérique
Reynoutria japonica	Renouée du Japon
Reynoutria x bohemica	Renouée de Bohême
Rhus typhina	Sumac hérissé
Robinia pseudoacacia	Robinier faux-acacia
Senecio inaequidens	Séneçon du Cap
Setaria parviflora	Sétaire de Faber
Solidago canadensis	Solidage du Canada
Solidago gigantea	Solidage géant
Soliva sessilis	Soliva sessile
Sorghum halepense	Sorgho d'Alep
Sporobolus indicus	Sporobole fertile
Symphyotrichum lanceolatum	Aster lancéolé
Symphyotrichum x salignum	Aster à feuilles de Saule
Symphyotrichum squamatum	Aster écailleux
Viburnum tinus	Viorne tin
Xanthium orientale	Lampourde à gros fruits
Zantedeshia aethiopica	Richarde

Quésaquo ?

La notion d'espèce exotique envahissante est définie selon le règlement européen R1143/2014 comme « une espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer une **menace** ou avoir des **effets néfastes** pour la biodiversité et les services écosystémiques associés ». Des impacts sociaux-économiques et sanitaires peuvent s'ajouter en fonction des espèces. Une espèce exotique envahissante affecte les habitats naturels et les espèces indigènes par sa prolifération, sa niche écologique et/ou son comportement qui engendre des modifications de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes. Le **pouvoir envahissant** d'une espèce exotique est dû à une forte capacité de reproduction, un fort potentiel adaptatif vis-à-vis des conditions environnementales et une exploitation efficace des ressources environnementales. Leur propagation est due à des facteurs anthropiques et naturels. Un habitat ayant subis des perturbations est plus favorable à la colonisation d'espèces exotiques envahissantes (EEE).

L'introduction des EEE par l'Homme peut être **volontaire ou involontaire**, plusieurs voies d'introduction et de propagation existent : horticulture, fins ornementales hors horticulture, transport de matériel, véhicules (voitures, trains, etc.), etc. **L'horticulture ornementale** est l'une des **voies d'introduction et de propagation principale** de plantes exotiques. C'est pourquoi il est important de prendre en compte ces espèces dans la palette végétale afin d'éviter de les planter.

La liste des plantes exotiques envahissantes à impact majeur répandues en Pays de la Loire présentée à gauche est **à proscrire** pour l'implémentation d'un couvert végétal. Cette liste n'est pas exhaustive.

Herbe de la Pampa

Souchet vigoureux

Balsamine de l'Himalaya

Jussie à grandes fleurs

Renouée du Japon

Arbre à papillon

Milieu boisé

Strates arborée et arbustive pour renforcer l'espace arrière

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
Arbutus unedo	Arbousier commun	10-1	A	Blanc	2	3	2
Ilex aquifolium	Houx	5-6	A	Blanc	2	2	3
Quercus suber	Chêne liège	4-5	A	Jaune	1	3	2
Acer campestris	Erable champêtre	4-5	N	Vert	1	2	3
Acer monspessulanum	Erable de Montpellier	5	N	Jaune	1	3	2
Carpinus betulus	Charme commun	4-5	N	Jaune	1	2	3
Clematis vitalba	Clématite des haies	6-8	N	Blanc	2	2	3
Corylus avellana	Noisetier	1-3	N	Jaune	2	2	3
Pinus sylvestris	Pin sylvestre	5-6	N	-	1	1	3
Prunus avium	Cerisier des bois	4-5	N	Blanc	1	2	3
Quercus petrea	Chêne sessile	3-5	N	Jaune	2	2	3
Quercus pubescens	Chêne pubescent	4-5	N	Jaune	1	3	2
Quercus robur	Chêne pédonculé	4-5	N	Jaune	1	2	3
Sorbus torminalis	Alisier torminal	5	N	Blanc	1	2	3
Tilia platyphyllos	Tilleul à grandes feuilles	6-7	N	Blanc	2	3	3
Ulmus minor	Orme champêtre	3-4	N	Rose	1	2	3
Cornus mas	Cornouiller sauvage	3	B	Jaune	1	3	3
Ligustrum vulgare	Troëne	5-7	B	Blanc	2	2	2
Prunus malaheb	Cerisier de Sainte-Lucie	4-5	B	Blanc	1	2	2
Viburnum lantana	Viorne lantane	4-5	B	Blanc	1	2	2
Crataegus germanica	Néflier	5	A	Blanc	2	2	3
Cytisus scoparius	Genêt à balais	4-7	A	Jaune	1	2	3
Erica scoparia	Bruyère à balais	5-7	A	Blanc	1	3	2
Lonicera periclymenum	Chèvrefeuille des bois	6-9	A	Blanc	2	2	3
Ulex europaeus	Ajonc d'Europe	2-6	A	Jaune	1	2	2
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	5-6	N	Blanc	2	2	3
Crataegus monogyna	Aubépine monogyne	4-9	N	Blanc	1	2	3
Euonymus europaeus	Fusain d'Europe	4-5	N	Blanc	2	2	3
Juniperus communis	Génévrier commun	4-5	N	Jaune-Vert	1	2	2
Prunus spinosa	Prunellier épine noire	4	N	Blanc	1	2	3
Sambucus nigra	Sureau noir	5-7	N	Blanc	2	2	3

Légende

Lumière

Température



Humidité du sol

pH du sol

N : Neutre
A : Acide
B : basique

Chêne pédonculé

Charme commun

Erable champêtre

Alisier torminal

Fusain d'Europe

Troëne

Conseils

Les essences de feuillus sont les mieux adaptées à notre climat. Les feuilles permettent de conserver la fraicheur tandis qu'après leur chute, le sol peut être réchauffé par les rayons du soleil.

Les bosquets ou petits bois composés d'arbustes, d'arbrisseaux et d'arbres sont de véritables refuges pour la faune. Il est essentiel de séparer les plants utilisés de 2,5 à 3 m. La dynamique herbacée de ce milieu va s'enrichir avec le temps avec des mousses, champignons, fougères...

Les alignements d'arbres permettent la nidification d'espèces, servent de refuge et de ressource alimentaire et participent à la cohérence de la TVB. Il est important de diversifier les essences au sein d'un même alignement pour limiter la propagation de maladies et de parasites.

Milieu boisé

Strate herbacée pour fleurir l'espace arrière

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
Ajuga reptans	Bugle rampante	4-8	N	Violet	2	2	3
Alliaria petiolata	Alliaire	4-6	N	Blanc	2	2	3
Anemone nemorosa	Anémone des bois	3-5	N	Blanc	2	2	3
Angelica sylvestris	Angélique sauvage	7-9	N	Blanc	2	2	4
Aquilegia vulgaris	Ancolie vulgaire	5-7	N	Violet	2	2	3
Arum italicum	Pied-de-Veau	4-5	N	Blanc	2	2	3
Brachypodium sylvaticum	Brachypode des bois	6-9	N	Vert	2	2	3
Buglossoides purpurocaerulea	Grémil pourpre bleu	4-6	B	Bleu	2	3	2
Carex flacca	Laîche glauque	4-6	B	Noir	3	2	3
Carex sylvatica	Laîche des bois	5-7	N	Vert	2	2	3
Chaerophyllum hirsutum	Cerfeuil hérissé	6-8	N	Blanc	3	1	4
Digitalis lutea	Digitale jaune	6-9	N	Jaune	2	2	3
Fragaria vesca	Fraisier des bois	4-6	N	Blanc	2	2	3
Geranium robertianum	Géranium herbe à Robert	4-9	N	Rose	2	2	3
Geum urbanum	Benoîte urbaine	5-9	N	Jaune	2	2	3
Glechoma hederacea	Lierre terrestre	3-5	N	Violet	2	2	3
Primula veris	Primevère officinale	3-5	B	Jaune	3	2	2
Pulmonaria affinis	Pulmonaire affine	4-5	A	Bleu	2	2	3
Ruscus aculaetus	Fragon	9-4	A	Vert	2	3	2
Sambucus ebulus	Sureau yèble	6-8	B	Blanc	3	2	3
Stachys recta	Epiaire droite	6-9	B	Blanc	3	2	2
Stellaria holostea	Stellaire holostée	4-6	A	Blanc	2	2	3
Vicia sepium	Vesce des haies	5-9	N	Violet	2	2	3
Viola hirta	Violette hérissée	3-5	B	Violet	2	2	2
Viola odorata	Violette odorante	3-5	N	Violet	2	2	3
Viola reichenbachiana	Violette des bois	4-5	N	Violet	2	2	3

Stellaire holostée

Grémil pourpre bleu

Bugle rampante

Géranium Herbe à Robert

Alliaire

Lierre terrestre

Conseils

Cette palette peut être utilisée pour accompagner le **développement de la strate herbacée** d'un petit bois mais elle peut également servir dans des milieux qui demandent **peu de lumière, par exemple exposés au Nord des bâtiments**.

Légende



Milieu ouvert

Haie champêtre pour matérialiser la limite Est

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
Acer campestris	Erable champêtre	4-5	N	Vert	1	2	3
Buxus sempervirens	Buis commun	3-4	B	Jaune	2	3	2
Carpinus betulus	Charme commun	4-5	N	Jaune	1	2	3
Clematis vitalba	Clématite des haies	6-8	N	Blanc	2	2	3
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	5-6	N	Blanc	2	2	3
Crataegus monogyna	Aubépine monogyne	4-9	N	Blanc	1	2	3
Cytisus scoparius	Genêt à balais	4-7	A	Jaune	1	2	3
Erica cinerea	Bruyère cendrée	6-9	A	Rose	3	2	2
Euonymus europaeus	Fusain d'Europe	4-5	N	Blanc	2	2	3
Juniperus communis	Génévrier commun	4-5	N	-	1	2	2
Ligustrum vulgare	Troëne	5-7	B	Blanc	2	2	2
Lonicera periclymenum	Chèvrefeuille des bois	6-9	A	Blanc	2	2	3
Malus sylvestris	Pommier sauvage	4-5	A	Blanc	2	2	3
Populus tremula	Peuplier tremble	3-4	A	Vert	3	2	3
Prunus avium	Cerisier des bois	4-5	N	Blanc	1	2	3
Prunus malaheb	Cerisier de Sainte-Lucie	4-5	B	Blanc	1	2	2
Prunus spinosa	Prunellier épine noire	4	N	Blanc	1	2	3
Pyrus communis subsp pyraster	Poirier sauvage	4-5	A	Blanc	2	2	3
Pyrus cordata	Poirier à feuilles en cœur	4	A	Blanc	2	2	2
Quercus pubescens	Chêne pubescent	4-5	N	Jaune	1	3	2
Quercus robur	Chêne pédonculé	4-5	N	Jaune	1	2	3
Rhamnus alaternus	Nerprun alterne	3-4	N	Jaune	3	3	2
Rosa canina	Eglantier des chiens	5-7	N	Rose	3	2	2
Rosa sempervirens	Rosier toujours vert	5-6	N	Blanc	3	2	3
Sambucus nigra	Sureau noir	5-7	N	Blanc	2	2	3
Tilia platyphyllos	Tilleul à grandes feuilles	6-7	N	Blanc	2	3	3
Ulex europaeus	Ajonc d'Europe	2-6	A	Jaune	1	2	2
Ulmus minor	Orme champêtre	3-4	N	Rose	1	2	3
Viburnum lantana	Viorne lantane	4-5	B	Blanc	1	2	2

Ajonc d'Europe

Viorne lantane

Cornouiller sanguin

Aubépine monogyne

Prunellier épine noire

Eglantier des chiens

Conseils

Les haies champêtres présentent de nombreux avantages pour la faune en servant de lieu de reproduction, d'abri et de source de nourriture. Elles apportent d'autres intérêts comme l'adaptation aux conditions climatiques, la protection contre le vent ou la réduction du ruissellement.

L'élaboration d'une haie consiste à planter les essences **sur deux rangs en quinconce espacés d'un mètre**. La **libre évolution** des essences utilisées permettra d'offrir une floraison et une fructification abondante et diversifiée.

Réaliser un **paillage organique** au pied de la haie permettra de conserver l'humidité du sol. Le taillage de la haie s'effectue entre **fin août et décembre** afin d'éviter la période de nidification.

L'entretien peut consister à **élaguer** quelques branches pour réduire le volume de la haie tout en conservant le port de l'arbre.

Légende



Milieu ouvert

Les espaces prairiaux existants à améliorer

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
Achillea millefolium	Achillée millefeuille	6-9	N	Blanc	3	2	3
Agrimonia eupatoria	Aigremoine commune	6-9	B	Jaune	2	2	2
Anthoxanthum odoratum	Flouve odorante	4-6	A	Jaune	3	2	3
Briza media	Brize intermédiaire	5-7	N	Rose	3	2	2
Bromopsis erecta	Brome érigé	5-7	B	Vert	3	2	2
Bromus hordeaceus	Brome mou	4-7	N	Vert	3	2	2
Centaurea jacea	Centaurée jacée	6-9	N	Rose	3	2	3
Cichorium intybus	Chicorée amère	7-9	B	Bleu	3	2	3
Cyanus segetum	Bleuet des moissons	5-7	A	Bleu	3	2	3
Dactylis glomerata	Pied-de-poule	4-9	N	Vert	3	2	3
Daucus carota	Carotte sauvage	5-10	N	Blanc	3	2	3
Dipsacus fullonum	Cabaret des oiseaux	7-9	N	Rose	3	2	3
Echium vulgare	Vipérine commune	5-8	N	Bleu	3	2	2
Galium mollugo	Gaillet commun	6-8	N	Blanc	3	2	3
Holcus lanatus	Houlque laineuse	5-8	A	Rose	3	2	3
Hypericum perforatum	Millepertuis perforé	6-9	N	Jaune	3	2	3
Knautia arvensis	Knautie des champs	6-8	N	Rose	3	2	2
Lathyrus latifolius	Gesse à larges feuilles	6-8	B	Rose	2	3	2
Lathyrus pratensis	Gesse des prés	5-8	N	Jaune	2	2	3
Leucanthemum vulgare	Marguerite commune	5-8	N	Blanc	3	2	3
Linum usitatissimum subsp angustifolium	Lin bisannuel	5-7	N	Bleu	3	3	3
Malva moschata	Mauve musquée	6-9	N	Rose	3	2	3
Muscari comosum	Muscari à toupet	4-6	N	Violet	3	3	2
Oenanthe pimpinelloides	Oenanthe faux-boucage	6-7	N	Blanc	3	3	3
Origanum vulgare	Origan commun	7-9	N	Rose	2	2	3
Papaver rhoeas	Coquelicot	5-7	N	Rouge	3	2	2
Poa trivialis	Pâturin commun	4-7	N	Vert	2	2	3
Ranunculus acris	Bouton d'or	5-9	N	Jaune	3	2	3
Rumex acetosa	Oseille des prés	5-9	N	Rouge	3	2	3
Salvia pratensis	Sauge des prés	5-7	B	Violet	3	3	2
Scabiosa columbaria	Scabieuse colombaire	6-10	N	Rose	3	2	2
Trifolium pratense	Trèfle des prés	5-9	N	Rose	3	2	3
Verbascum thapsus	Molène bouillon-blanc	6-11	N	Jaune	3	2	2
Vicia cracca	Jarosse	6-8	N	Violet	2	2	3

Légende

Lumière : 1 Ombre, 2 Mi-ombre, 3 Lumière

Température : 1 Froid, 2 Tempéré, 3 Chaud

Humidité du sol : 1 Très sec, 2 Sec, 3 Temporairement humide, 4 Humide

pH du sol
N : Neutre
A : Acide
B : basique

Achillée millefeuille

Sauge des prés

Brize intermédiaire

Bleuet des moissons

Vipérine commune

Oenanthe faux-boucage

Conseils

Le site choisi pour le **développement d'une prairie** doit être ensoleillé, protégé des vents dominants et du piétinement, le sol doit être pauvre en matière organique. Un excès de nutriment favorisera les graminées au préjudice des autres espèces.

Privilégiez une **fauche tardive** à la fin de l'été ou de l'automne pour que les espèces réalisent en entier leur cycle de vie. Après que les résidus de fauche soient restés sur place pendant quelques jours, **exportez-les** pour ne pas enrichir le sol. Ils peuvent être réutilisés pour le paillage ou le compostage. La **fauche annuelle** n'est pas obligatoire mais il est essentiel de la maintenir au moins tous les 2 ou 3 ans afin d'éviter la fermeture du milieu.

Pour les espaces enherbés où la **diversité floristique est faible**, un réensemencement permettra d'améliorer la richesse spécifique.

Milieu ouvert

Les gazons aux abords des bâtiments

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
Achillea millefolium	Achillée millefeuille	6-9	N	Blanc	3	2	3
Anthyllis vulneraria	Anthyllide vulnéraire	5-8	N	Jaune	3	2	2
Bellis perennis	Pâquerette	3-11	N	Blanc	3	2	3
Capsella bursa-pastoris	Capselle bourse-à-pasteur	3-12	N	Blanc	3	2	3
Centaurium erythraea	Petite centaurée commune	6-9	N	Rose	3	2	3
Crepis capillaris	Crépide capillaire	6-9	N	Jaune	3	2	2
Lolium perenne	Ivraie vivace	5-10	N	Vert	3	2	3
Lotus corniculatus	Lotier corniculé	5-9	N	Jaune	3	2	2
Muscari neglectum	Muscari à grappes	3-5	N	Violet	3	3	2
Myosotis arvensis	Myosotis des champs	4-9	N	Bleu	2	2	3
Plantago lanceolata	Plantain lancéolé	4-10	N	Blanc	3	2	3
Poa trivialis	Pâturin commun	4-7	N	Vert	2	2	4
Potentilla reptans	Potentille rampante	6-10	N	Jaune	3	2	3
Prunella vulgaris	Brunelle commune	6-9	N	Violet	2	2	3
Trifolium fragiferum	Trèfle porte-fraises	6-9	N	Rose	3	3	4
Trifolium pratense	Trèfle des prés	5-9	N	Rose	3	2	3
Trifolium repens	Trèfle rampant	5-10	N	Blanc	3	2	3
Veronica chamaedrys	Véronique petit-chêne	4-6	N	Bleu	2	2	3
Viola odorata	Violette odorante	3-5	N	Violet	2	2	3

Lotier corniculé

Trèfle des prés

Véronique petit-chêne

Petite centaurée commune

Brunelle commune

Trèfle porte-fraises

Légende

Lumière
1 Ombre
2 Mi-ombre
3 Lumière

Température
1 Froid
2 Tempéré
3 Chaud

Humidité du sol
1 Très sec
2 Sec
3 Temporairement humide
4 Humide

pH du sol
N : Neutre
A : Acide
B : basique

Conseils

Le gazon peut être une structure paysagère intéressante. Pour cela, il suffit de réaliser une hauteur de végétation un peu plus élevée en formant des courbes ou des lignes entre différents espaces. On appelle cette méthode la **fauche différenciée**.

Réaliser une **coupe haute** du gazon à 6-8 cm présente plusieurs avantages : économiser plusieurs tontes, rendre le gazon plus résistant à la sécheresse, avoir un meilleur développement racinaire, limiter le développement de mousses et surtout favoriser d'autres plantes comme le trèfle.

La qualité et la santé du sol ne sera que meilleure en mettant en place cette préconisation de gestion.

Milieu ouvert

Les parterres en mosaïque

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
Agrimonia eupatoria	Aigremoine commune	6-9	B	Jaune	2	2	2
Blackstonia perfoliata	Chlorette	5-9	N	Jaune	3	2	4
Borago officinalis	Bourrache officinale	4-9	N	Bleu	3	2	2
Calluna vulgaris	Callune	7-10	A	Rose	2	2	3
Campanula glomerata	Campanule agglomérée	6-9	N	Violet	3	2	2
Centaurea scabiosa	Centaurée scabieuse	7-8	B	Rose	3	2	2
Dianthus armeria	Œillet armérie	6-8	A	Rose	3	3	2
Digitalis lutea	Digitale jaune	6-8	N	Jaune	2	2	3
Galactites tomentosus	Chardon laiteux	5-8	B	Rose	3	3	1
Geranium sanguineum	Géranium sanguin	6-7	B	Rose	2	2	2
Helianthemum nummularium	Hélianthème à feuilles arrondies	5-9	N	Jaune	3	2	2
Lamium maculatum	Lamier maculé	4-10	N	Rose	2	2	3
Legousia speculum-veneris	Miroir de Vénus	5-7	B	Bleu	3	3	2
Leucanthemum vulgare	Marguerite commune	5-8	N	Blanc	3	2	3
Linum strictum	Lin raide	5-7	N	Jaune	3	3	1
Matricaria chamomilla	Matricaire Camomille	5-9	A	Blanc	3	2	3
Melilotus albus	Mélilot blanc	6-9	N	Blanc	3	2	2
Narcissus pseudonarcissus	Jonquille	3-5	N	Jaune	2	2	3
Ononis striata	Bugrane striée	6-8	B	Jaune	3	2	2
Papaver rhoeas	Coquelicot	5-7	N	Rouge	3	2	3
Prunella laciniata	Brunelle laciniée	6-9	N	Blanc	3	3	2
Salvia pratensis	Sauge des prés	5-7	B	Violet	3	3	2
Saponaria officinalis	Saponaire offficinale	6-9	N	Rose	3	2	3
Scabiosa columbaria	Scabieuse colombaire	6-10	N	Rose	3	2	2
Silene dioica	Silène dioïque	5-7	N	Rouge	2	2	3
Stachys recta	Epiaire droite	6-9	B	Blanc	3	2	2
Tanacetum vulgare	Tanaisie commune	7-9	B	Jaune	3	2	2
Teucrium chamaedrys	Germandrée petit-chêne	5-9	B	Rose	3	3	2
Thymus vulgaris	Thym commun	4-9	B	Rose	3	3	1
Verbena officinalis	Verveine officinale	6-10	N	Violet	3	2	3

Callune

Thym commun

Campanule agglomérée

Bourrache officinale

Saponaire officinale

Scabieuse colombaire

Conseils

Les espèces exotiques et les variétés horticoles ne présentent **aucun avantage** pour la biodiversité et peuvent être même considérées comme **nuisibles** pour les pollinisateurs.
Autant favoriser, même dans les parterres fleuris, des espèces végétales locales favorables aux insectes pollinisateurs.

Légende

Lumière

Température



Humidité du sol

pH du sol

N : Neutre
A : Acide
B : basique

Milieu humide

Strate herbacée des noues

Nom latin	Nom vernaculaire	Floraison	pH du sol	Couleur fleur	Lumière	Température	Humidité du sol
Agrostis stolonifera	Agrostide stolonifère	6-8	A	Vert	3	2	4
Althaea officinalis	Guimauve officinale	6-9	B	Blanc	3	2	4
Cardamine pratensis	Cardamine des prés	4-6	N	Rose	2	2	3
Carex acutiformis	Laîche des marais	4-6	N	Marron	2	2	4
Carex otrubae	Laîche cuivrée	5-7	N	-	3	2	3
Carex pendula	Laîche à épis pendants	5-7	N	Marron	2	2	4
Cirsium palustre	Cirse des marais	7-9	A	Rose	3	2	4
Deschampsis caespitosa	Canche des champs	6-8	N	Vert	2	2	4
Elytrigia repens	Chiendent rampant	6-9	N	Vert	3	2	3
Epilobium hirsutum	Epilobe hérissé	6-9	B	Rose	3	2	4
Eupatorium cannabinum	Chanvre d'eau	7-8	N	Rose	2	2	4
Filipendula ulmaria	Reine des prés	6-8	N	Blanc	3	2	4
Iris pseudacorus	Iris des marais	4-7	N	Jaune	3	2	4
Juncus acutiflorus	Jonc acutiflore	6-8	A	Marron	3	2	4
Juncus effusus	Jonc épars	6-9	A	Vert	3	2	4
Juncus inflexus	Jonc glauque	6-8	B	Vert	3	2	4
Lotus pedunculatus	Lotus des marais	6-9	A	Jaune	3	2	4
Lychnis flos-cuculi	Œil-de-perdrix	5-8	N	Rose	3	2	4
Lycopus europaeus	Lycope d'Europe	7-9	N	Blanc	3	2	4
Lythrum salicaria	Salicaire pourpre	6-9	N	Rose	3	2	4
Mentha pulegium	Menthe pouillot	7-10	N	Rose	3	3	4
Mentha suaveolens	Menthe à feuilles rondes	7-9	N	Rose	3	3	4
Molinia caerulea	Molinie bleue	7-10	N	Bleu	2	2	4
Persicaria hydropiper	Renouée poivre d'eau	7-10	N	Rose	2	2	4
Phragmites australis	Roseau commun	8-9	N	Bleu	3	2	4
Succisa pratensis	Succise des prés	1-10	N	Rose	2	2	4
Typha latifolia	Massette australe	6-9	N	-	3	3	4
Valeriana officinalis	Valériane officinale	5-7	N	Rose	3	2	4
Veronica anagallis-aquatica	Mouron aquatique	5-9	N	Bleu	3	2	4
Veronica beccabunga	Véronique des ruisseaux	5-9	N	Bleu	3	2	4

Epilobe hérissée

Jonc épars

Reine des prés

Oeil-de-perdrix

Salicaire pourpre

Iris des marais

Conseils

Les prairies humides ont un rôle majeur dans le cycle de l'eau.
Elles servent dans l'épuration de l'eau et la régulation des inondations.

Les **milieux propices à un réensemencement** d'espèces hygrophiles sont les espaces en légères depressions, par exemple au fond des noues.

La flore des milieux humides est **fragile** c'est pourquoi il faut absolument éviter tout enrichissement du milieu (engrais par exemple).

Conserver le plus possible les espaces enherbés plus ou moins régulièrement inondés.

Légende





Bibliographie

Caillon A. (coord.), Bonifait S., Chabrol L., Leblond N., Ragache Q., (2022), Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-Aquitaine, CBN Sud-Atlantique (coord.), CBN du Massif Central et CBN des Pyrénées et Midi-Pyrénées, 116 pages + annexes

Flandin, J., (2019), Plantons local en Île-de-France, ARB îdF, p.102

Ventre V., Bieuzen P., (2023), Plantons local en Occitanie, ARB Occitanie, 156 pages